


1. Сполука формули



де


X вибраний з групи, що складається з F, Cl, Br, I,

Y вибраний з групи, що складається з F, Cl, Br, I,

Z означає C₁₋₆-алкоксигрупу,

R₁ означає C₁₋₆-алкіл,

R₂ означає заміщений феніл




W означає F, Cl або Br,


V означає F,

R₃ вибраний з групи, що складається з водню і C₁₋₆-алкілу,

R₄ вибраний з



R₅ вибраний з групи, що складається з C₁₋₆-алкілу, C₁₋₆-алкоксигрупи, C₃₋₈-циклоалкоксигрупи, гетероциклу, вибраного з морфоліну, 1,1-діоксотіоморфоліну, піперазину, необов'язково заміщеного C₁₋₆-алкілом або -C(O)O-C₁₋₆-алкілом,



$-(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_4\text{-OP(O)(OR}_6)_2$, $-(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{-OCH}_3$, де n дорівнює від 3 до 8,

метоксиполіетилєнєлієколю (мПЄГ), що має середню молекулярну масу (M.W.) від 750 до 2200 Да, $\text{NH-CH}_2\text{CH}_2\text{-мПЄГ}$, що має середню M.W. від 550 до 2000 Да (мПЄГ- NH_2), і аміногрупи, заміщеної тетрагідропіраном або C_{1-6} -алкілом, необов'язково заміщеним OH, C_{1-6} -алкоксигрупою, $-\text{C(O)OR}_6$ або [1,3]дієксоланом, необов'язково заміщеним C_{1-6} -алкілом,

R_6 означає водєнь, C_{1-6} -алкіл або бензил; або

її фармацевтично прийнятна сіль.

2. Сполука за п. 1, де

X означає Cl,

Y означає F,

R_1 означає C_{1-6} -алкіл,

R_3 означає водєнь або C_{1-6} -алкіл,

R_5 вибраний з групи, що складається з C_{1-6} -алкілу, $-(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{-OCH}_3$, де n дорівнює від 3 до 8, $-(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_4\text{-OP(O)(OR}_6)_2$, і

R_6 означає водєнь; або

її фармацевтично прийнятна сіль.

3. Сполука за п. 1, вибрана з групи, що складається з наступних сполук:

1-(етил(ієопропіл)карбамоїлоксі)етил 4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфєніл)-4-(4-хлор-2-фторфєніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідін-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоат,

ди-трет-бутоксифосфєрилоксимєтиловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфєніл)-4-(4-хлор-2-фторфєніл)-4-ціано-5-(2,2-димєтилпропіл)піролідін-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти,

1-[біс-(2-метоксієтил)карбамоїлоксі]єтиловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфєніл)-4-(4-хлор-2-фторфєніл)-4-ціано-5-(2,2-димєтилпропіл)піролідін-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти,

1-(4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфєніл)-4-(4-хлор-2-фторфєніл)-4-ціано-5-(2,2-димєтилпропіл)піролідін-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензоїлоксі)єтиловий ефір 4-

метилпіперазин-1-карбонової кислоти,

1-ацетоксіетил-4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоат,

рац-1-(ізобутирилоксі)етил-4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоат,

ацетоксиметиловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти,

1-(циклогексилоксикарбонілоксі)етил-4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоат,

рац-1-(ізопропоксикарбонілоксі)етил-4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоат,

1-(4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоїлоксі)етилморфолін-4-карбоксилат і (R)-1-(4-{[(2R,3S,4R,5S)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензоїлоксі)етиловий ефір морфолін-4-карбонової кислоти.

4. Сполука за п. 1, вибрана з групи, що складається з наступних сполук:

(S)-1-(4-{[(2R,3S,4R,5S)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензоїлоксі)етиловий ефір морфолін-4-карбонової кислоти,

рац-1-трет-бутил-4-(1-(4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоїлоксі)етил)піперазин-1,4-дикарбоксилат,

дигідрохлорид 1-(4-{[(2R,3S,4R,5S)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензоїлоксі)етиловий ефір піперазин-1-карбонової кислоти,

1-(4-{[(2R,3S,4R,5S)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензоїлоксі)етиловий ефір рац-1,1-діоксотіоморфолін-4-карбонової кислоти,

1-(2,2-диметил-[1,3]діоксолан-4-ілметилкарбамоїлоксі)етиловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти,

1-(2,3-дигідроксипропілкарбамоїлоксі)етиловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-4-(4-хлор-2-

фторфеніл)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти,

1-(тетрагідро-2Н-піран-4-ілкарбамоїлоксі)етил-4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоат,

1-{2-[2-(2-метоксіетоксі)етоксі]етоксикарбонілоксі}етиловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти,

1-(2-{2-[2-(2-метоксіетоксі)етоксі]етоксі}етоксикарбонілоксі)етиловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти,

1-[2-(2-{2-[2-(2-метоксіетоксі)етоксі]етоксі}етоксі)етоксикарбонілоксі]етиловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти і

21-оксо-2,5,8,11,14,17,20,22-октаоксатетракозан-23-іл-4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоат.

5. Сполука за п. 1, вибрана з групи, що складається з наступних сполук:

1-мПЕГ-карбонілоксіетиловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти (мПЕГ, середня M.W. ~750),

1-(2-(бензилоксі)-2-оксоетилкарбамоїлоксі)етил 4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоат,

2-((1-(4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоїлоксі)етокси)карбоніламіно)оцтова кислота,

(S)-2-[1-(4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензоїлоксі)етоксикарбоніламіно]пентандіова кислота,

1-((S)-1-карбоксіетилкарбамоїлоксі)етиловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти,

2-(((4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-

неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоїлокси)метокси)карбоніламіно)оцтова кислота,

(S)-дибензил-2-(((4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоїлокси)метокси)карбоніламіно)пентандіоат і

(S)-2-(((4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоїлокси)метокси)карбоніламіно)пентандіова кислота.

6. Сполука за п. 1, вибрана з групи, що складається з наступних сполук:

15-метил-12-оксо-2,5,8,11,13-пентаоксагексадекан-14-іл-4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоат,

3-оксо-2,4,7,10,13-пентаоксатетрадецил 4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоат,

3-оксо-2,4,7,10,13,16,19-гептаоксаікозил 4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоат,

1-мПЕГ-карбонілоксиметилловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти (мПЕГ, середня M.W. ~750),

1-мПЕГ-карбонілоксіетилловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти (мПЕГ, середня M.W. ~2000),

1-мПЕГ-карбонілоксиетилловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти (мПЕГ, середня M.W. ~2200),

1-мПЕГ-карбонілоксиметилловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти (мПЕГ, середня M.W. ~2000),

3-оксо-2,4,7,10,13-пентаоксатетрадецил 4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоат,

27-оксо-2,5,8,11,14,17,20,23,26,28-декаоксатриаконтан-29-іл-4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоат,

24-оксо-2,5,8,11,14,17,20,23,25-нонаоксагептакозан-26-іл-4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-

2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоат,

1-мПЕГ-карбонілоксіетиламід 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти (мПЕГ-NH₂, середня M.W. ~550) і

1-мПЕГ-карбонілоксіетиламід 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти (мПЕГ-NH₂, середня M.W. ~1000).

7. Сполука за п. 1, вибрана з групи, що складається з наступних сполук:

1-мПЕГ-карбонілоксіетиламід 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти (мПЕГ-NH₂, середня M.W. ~2000),

1-мПЕГ-карбонілоксиметиламід 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти (мПЕГ-NH₂, середня M.W. ~2000),

1-мПЕГ-карбонілоксиметиламід 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти (мПЕГ-NH₂, середня M.W. ~1000),

1-мПЕГ-карбонілоксиметиламід 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти (мПЕГ-NH₂, середня M.W. ~550),

(S)-2-(((4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоїлокси)метокси)карбоніламіно)пропанова кислота,

2-{2-[2-(2-фосфонооксіетоксі)етоксі]етоксі}етоксикарбонілоксиметиловий ефір дибензил-4-{[(2R,3S,4R,5S)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти,

2-{2-[2-(2-фосфонооксіетоксі)етоксі]етоксі}етоксикарбонілоксиметиловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти,

фосфонооксиметиловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти; сполука з трифтороцтової кислоти,

1-(((3aR,5R,6S,6aR)-5-((R)-2,2-диметил-1,3-діоксолан-4-іл)-2,2-

диметилтетрагідрофуоро[3,2-d][1,3]діоксол-6-ілокси)карбонілоксі)етил 4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоат,

1-[(2R,3R,4R,5S)-2-((R)-1,2-дигідроксіетил)-4,5-дигідрокситетрагідрофуран-3-ілоксикарбонілоксі]етиловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти,

1-(2-{2-[2-(2-добензилоксифосфорилоксіетоксі)етоксі]етоксі}етоксикарбонілоксі)-етиловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти і

1-(2-{2-[2-(2-фосфонооксіетоксі)етоксі]етоксі}етоксикарбонілоксі)етиловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти.

8. Сполука за п. 1, вибрана з групи, що складається з наступних сполук:

1-[2-(2-{2-[2-(2-метоксіетоксі)етоксі]етоксі}етоксі)етоксикарбонілоксі]етиловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти,

15-метил-12-оксо-2,5,8,11,13-пентаоксагексадекан-14-іл-4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоат,

3-оксо-2,4,7,10,13-пентаоксатетрадецил-4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоат,

3-оксо-2,4,7,10,13,16,19-гептаоксаікозил-4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоат,

3-оксо-2,4,7,10,13-пентаоксатетрадецил 4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоат,

27-оксо-2,5,8,11,14,17,20,23,26,28-декаоксатриаконтан-29-іл 4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоат,

24-оксо-2,5,8,11,14,17,20,23,25-нонаоксагептакозан-26-іл 4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоат.

9. Сполука за п. 1, якою є 3-оксо-2,4,7,10,13,16,19-гептаоксаікозил-4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-

карбоксамідо)-3-метоксибензоат.

10. Сполука 1-мПЕГ-карбонілоксиетилловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти (мПЕГ, середня M.W. ~2000).

11. Сполука 1-мПЕГ-карбонілоксиетилловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти (мПЕГ, середня M.W. ~2200).

12. Сполука за п. 1, якою є 1-мПЕГ-карбонілоксиметилловий ефір 4-{[(2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-(2,2-диметилпропіл)піролідин-2-карбоніл]аміно}-3-метоксибензойної кислоти (мПЕГ, середня M.W. ~2000).

13. Сполука за п. 1, якою є 3-оксо-2,4,7,10,13-пентаоксатетрадецил-4-((2R,3S,4R,5S)-3-(3-хлор-2-фторфеніл)-4-(4-хлор-2-фторфеніл)-4-ціано-5-неопентилпіролідин-2-карбоксамідо)-3-метоксибензоат.

14. Сполука за будь-яким з пп. 1-13 для застосування як лікарського засобу.

15. Фармацевтична композиція, яка включає сполуку за будь-яким з пп. 1-13 і терапевтично інертний носій.

16. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-13 для лікування раку.

17. Застосування сполуки за будь-яким з пп. 1-13 для виготовлення лікарського засобу для лікування раку.

18. Сполука за будь-яким з пп. 1-13 для лікування або профілактики раку.

19. Спосіб лікування раку, за яким вводять ефективну кількість сполуки, розкритої в будь-якому з пп. 1-13.