


1. Фармацевтична композиція зі сповільненим вивільненням для лікування або попередження гіпертонії або зазвичай високого артеріального тиску, яка містить як активний компонент сполуку 2-фенілтіазолу, представлену наступною хімічною формулою (I):



де

R¹ означає C₁₋₈ алкоксигрупу, морфоліногрупу, 4-метилпіперазин-1-ільну групу або піперидиногрупу;

R² означає нітрогрупу або ціаногрупу;

X означає карбоксильну групу або C₂₋₇ алкоксикарбонільну групу; та

Y означає атом водню або C₁₋₆ алкільну групу

або її фармацевтично прийнятну сіль.

2. Фармацевтична композиція за п. 1, яка **відрізняється** тим, що гіпертонія або зазвичай високий артеріальний тиск означає гіпертонію або зазвичай високий артеріальний тиск з гіперурикемією або подагрою.

3. Фармацевтична композиція за п. 1, яка **відрізняється** тим, що гіпертонія або зазвичай високий артеріальний тиск означає гіпертонію або зазвичай високий артеріальний тиск з нирковою дисфункцією.

4. Фармацевтична композиція зі сповільненим вивільненням для лікування або попередження ниркової дисфункції, яка містить як активний компонент сполуку 2-фенілтіазолу, представлену формулою (I) або її фармацевтично прийнятною сіллю.


5. Фармацевтична композиція зі сповільненим вивільненням за п. 4, де ниркова дисфункція означає ниркову дисфункцію з гіперурикемією або подагрою.

6. Фармацевтична композиція за п. 4, яка **відрізняється** тим, що ниркова дисфункція означає ниркову дисфункцію з гіпертонією або зазвичай високим артеріальним тиском.

7. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 4-6, яка **відрізняється** тим, що ниркова дисфункція означає діабетичну нефропатію, хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром або IgA нефропатію.

8. Фармацевтична композиція за будь-яким з пп. 1-7, яка **відрізняється** тим, що сполука 2-фенілтіазолу, представлена формулою (I), є 2-(3-ціано-4-ізобутилоксифеніл)-4-метил-5-тіазолкарбоною кислотою або її фармацевтично прийнятною сіллю.

9. Спосіб лікування або попередження гіпертонії або зазвичай високого артеріального тиску, який включає введення, в ефективній кількості для лікування або попередження гіпертонії або зазвичай високого артеріального тиску, і способом сповільненого вивільнення, сполуки 2-фенілтіазолу, представлені наступною формулою (I):



де

R¹ означає C₁₋₈ алкоксигрупу, морфоліногрупу, 4-метилпіперазин-1-ільну групу або піперидиногрупу; R² означає нітрогрупу або ціаногрупу; X означає карбоксильну групу або C₂₋₇ алкоксикарбонільну групу; та

Y означає атом водню або C₁₋₆ алкільну групу або її фармацевтично прийнятну сіль.

10. Спосіб за п. 9, який **відрізняється** тим, що гіпертонія або зазвичай високий артеріальний

тиск означає гіпертонію або зазвичай високий артеріальний тиск з гіперурикемією або подагрою.

11. Спосіб за п. 9, який **відрізняється** тим, що гіпертонія або зазвичай високий артеріальний тиск означає гіпертонію або зазвичай високий артеріальний тиск з нирковою дисфункцією.

12. Спосіб лікування або попередження ниркової дисфункції, який включає введення, в ефективній кількості для лікування або попередження ниркової дисфункції, і способом сповільненого вивільнення, сполуки 2-фенілтіазолу, представленої формулою (I) або її фармацевтично прийнятною сіллю.

13. Спосіб за п. 12, який **відрізняється** тим, що ниркова дисфункція означає ниркову дисфункцію з гіперурикемією або подагрою.

14. Спосіб за п. 12, який **відрізняється** тим, що ниркова дисфункція означає ниркову дисфункцію з гіпертонією або зазвичай високим артеріальним тиском.

15. Спосіб за будь-яким з пп. 12-14, який **відрізняється** тим, що ниркова дисфункція означає діабетичну нефропатію, хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром, або IgA нефропатію.

16. Спосіб за будь-яким з пп. 9-15, який **відрізняється** тим, що сполука 2-фенілтіазолу, представлена формулою (I), є 2-(3-ціано-4-ізобутилоксифеніл)-4-метил-5-тіазолкарбоною кислотою або її фармацевтично прийнятною сіллю.